

	GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU ul. Polna 33, 60-535 Poznań	F 36 - U	
		Wydanie 1	Strona 1 z 1
Szczenie noworodka - wskazówki dla rodziców			

Noworodek został zaszczepiony przeciw gruźlicy BCG w lewe ramię. Po 3-4 tygodniach w miejscu szczepienia powstaje naciek. Naciek może ulec rozpadowi z obecnością ropnej wydzieliny i owrzodzeniem, które utrzymuje się przez kilka tygodni i goi się pozostawiając białą bliznę.

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

- należy zwrócić uwagę, aby miejsce wstrzyknięcia szczepionki i jego okolice nie były uciskane przez odzież i dotykane palcami,
- miejsce szczepienia należy utrzymywać w czystości, nie smarować żadną maścią i nie robić okładów,
- przy kąpielii dziecka należy zachować ostrożność, by nie zamoczyć i nie podrażniać miejsca szczepienia,

Łącznie ze szczepieniem BCG wykonywane jest szczepienie przeciw Wirusowemu Zapaleniu Wątroby typu B.

Na kolejne szczepienie należy się udać do Poradni Lekarza Rodzinnego po upływie 7-8 tygodni od dnia pierwszego szczepienia.

	GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU ul. Polna 33, 60-535 Poznań	F 36 - U	
		Wydanie 1	Strona 1 z 1
Szczenie noworodka - wskazówki dla rodziców			

Noworodek został zaszczepiony przeciw gruźlicy BCG w lewe ramię. Po 3-4 tygodniach w miejscu szczepienia powstaje naciek. Naciek może ulec rozpadowi z obecnością ropnej wydzieliny i owrzodzeniem, które utrzymuje się przez kilka tygodni i goi się pozostawiając białą bliznę.

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

- należy zwrócić uwagę, aby miejsce wstrzyknięcia szczepionki i jego okolice nie były uciskane przez odzież i dotykane palcami,
- miejsce szczepienia należy utrzymywać w czystości, nie smarować żadną maścią i nie robić okładów,
- przy kąpielii dziecka należy zachować ostrożność, by nie zamoczyć i nie podrażniać miejsca szczepienia,

Łącznie ze szczepieniem BCG wykonywane jest szczepienie przeciw Wirusowemu Zapaleniu Wątroby typu B.

Na kolejne szczepienie należy się udać do Poradni Lekarza Rodzinnego po upływie 7-8 tygodni od dnia pierwszego szczepienia.

	GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU ul. Polna 33, 60-535 Poznań	F 36 - U	
		Wydanie 1	Strona 1 z 1
Szczenie noworodka - wskazówki dla rodziców			

Noworodek został zaszczepiony przeciw gruźlicy BCG w lewe ramię. Po 3-4 tygodniach w miejscu szczepienia powstaje naciek. Naciek może ulec rozpadowi z obecnością ropnej wydzieliny i owrzodzeniem, które utrzymuje się przez kilka tygodni i goi się pozostawiając białą bliznę.

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

- należy zwrócić uwagę, aby miejsce wstrzyknięcia szczepionki i jego okolice nie były uciskane przez odzież i dotykane palcami,
- miejsce szczepienia należy utrzymywać w czystości, nie smarować żadną maścią i nie robić okładów,
- przy kąpielii dziecka należy zachować ostrożność, by nie zamoczyć i nie podrażniać miejsca szczepienia,

Łącznie ze szczepieniem BCG wykonywane jest szczepienie przeciw Wirusowemu Zapaleniu Wątroby typu B.

Na kolejne szczepienie należy się udać do Poradni Lekarza Rodzinnego po upływie 7-8 tygodni od dnia pierwszego szczepienia.

	GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU ul. Polna 33, 60-535 Poznań	F 36 - U	
		Wydanie 1	Strona 1 z 1
Szczenie noworodka - wskazówki dla rodziców			

Noworodek został zaszczepiony przeciw gruźlicy BCG w lewe ramię. Po 3-4 tygodniach w miejscu szczepienia powstaje naciek. Naciek może ulec rozpadowi z obecnością ropnej wydzieliny i owrzodzeniem, które utrzymuje się przez kilka tygodni i goi się pozostawiając białą bliznę.

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

- należy zwrócić uwagę, aby miejsce wstrzyknięcia szczepionki i jego okolice nie były uciskane przez odzież i dotykane palcami,
- miejsce szczepienia należy utrzymywać w czystości, nie smarować żadną maścią i nie robić okładów,
- przy kąpielii dziecka należy zachować ostrożność, by nie zamoczyć i nie podrażniać miejsca szczepienia,

Łącznie ze szczepieniem BCG wykonywane jest szczepienie przeciw Wirusowemu Zapaleniu Wątroby typu B.

Na kolejne szczepienie należy się udać do Poradni Lekarza Rodzinnego po upływie 7-8 tygodni od dnia pierwszego szczepienia.